効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－
日本ジェネリック製薬協会　調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞
本リストは日本ジェネリック製薬協会で独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。
すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいますようお願い申し上げます。
後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。
そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。
「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。 番号（①、②等）は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「－」は番号の付された効能効果等を取得しておりません。
なお、販売名の前に＊印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております（経過措置の期限：＊2024年3月31日、**2024年9月30日、***：2025年3月31日、
　****：2025年9月30日、、*****：2026年3月31日、******：2027年3月31日。厚生労働省ホームページの薬価基準収載品目リストで確認できたものを記載 ）
バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。
「違いのある効能効果等」欄のうち先発品の効能効果または用法用量が再審査期間中であることを確認できたものは赤文字にしております。

Ⅰ．先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アダリムマブ（遺伝子組換え）	①化膿性汗腺炎 ②壊疽性膿皮症	40mg0.4mL1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アッヴィ	①②
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	—
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」	日本化薬	—
		40mg0.8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	第一三共	—
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス=サンド	—
		40mg0.4mL1キット		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アッヴィ	①②
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	—
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	日本化薬	—
		40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	第一三共	—
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス=サンド	—
		80mg0.8mL1キット		ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アッヴィ	①②
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	日本化薬	—
		80mg0.8mL1筒		ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アッヴィ	①②
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	持田=あゆみ製薬	—
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「CTNK」	日本化薬	—
アフリベルセプト	①糖尿病黄斑浮腫 ②血管新生緑内障	2mg0.05mL1筒		アイリーア硝子体内注射用キット40mg／mL	バイエル＝参天	①②
			後発	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	バイエルLS＝参天	①
			後発	アフリベルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」	富士製薬＝日東メディック	①
アフリベルセプト	①糖尿病黄斑浮腫 ②血管新生緑内障 ③未熟児網膜症	2mg0.05mL1瓶		アイリーア硝子体内注射液40mg／mL	バイエル＝参天	①②③
			後発	アフリベルセプトBS硝子体内注射液40mg/mL「NIT」	富士製薬＝日東メディック	①
アンブリセンタン	①小児の用法用量	2.5mg1錠		ヴォリブリス錠2.5mg	GSK	①
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ＝三和化学	—
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	［45mg、90mg製剤］ ①中等症から重症の活動期クローン病の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ②中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ③上記中等症から重症の活動期クローン病の維持療法の用法用量における小児の用法用量	45mg0.5mL1筒		ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ	①②③
			後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	富士製薬	①
			後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」	セルトリオン	①
			後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「YD」	陽進堂	—
		90mg1mL1筒	後発	ウステキヌマブBS皮下注90mgシリンジ「F」	富士製薬	①

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	［130mg製剤］ ①中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る） ②中等症から重症の活動期クローン病の維持療法の用法用量における小児の用法用量	130mg26mL1瓶		ステラーラ点滴静注130mg	ヤンセンファーマ	①②
			後発	ウステキヌマブBS点滴静注130mg「CT」	セルトリオン	—
エソメプラゾールマグネシウム水和物	①逆流性食道炎に対する1歳以上の幼児及び小児の用法用量における、さらに再発・再燃を繰り返す場合の維持療法の用法用量 ②非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能に対する、1歳以上の幼児及び小児の用法用量 ③低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能に対する1歳以上の幼児及び小児の用法用量	10mg1カプセル		ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ	①②③
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「YD」	陽進堂	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「日新」	日新製薬	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	ニプロ	—
	①逆流性食道炎に対する1歳以上の幼児及び小児の用法用量における、さらに再発・再燃を繰り返す場合の維持療法の用法用量	20mg1カプセル		ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ	①
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「YD」	陽進堂	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「日新」	日新製薬	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	ニプロ	—
エルトロンボパグ　オラミン	①再生不良性貧血	12.5mg1錠		レボレード錠12.5mg	ノバルティスファーマ	①
			後発	エルトロンボパグ錠12.5mg「F」	富士製薬工業＝トーアエイヨー	—
			後発	エルトロンボパグ錠12.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エルトロンボパグ錠12.5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エルトロンボパグ錠12.5mg「日医工」	日医工	—
		25mg1錠		レボレード錠25mg	ノバルティスファーマ	①
			後発	エルトロンボパグ錠25mg「F」	富士製薬工業＝トーアエイヨー	—
			後発	エルトロンボパグ錠25mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エルトロンボパグ錠25mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エルトロンボパグ錠25mg「日医工」	日医工	—
オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg1錠		オキシコンチンTR錠5mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共	—
		10mg1錠		オキシコンチンTR錠10mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共	—
		20mg1錠		オキシコンチンTR錠20mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共	—
		40mg1錠		オキシコンチンTR錠40mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	第一三共	—
ソマトロピン（遺伝子組換え）	①骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症における用法用量のうち、筋肉内注射の用法用量 ②骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長の用法用量のうち、筋肉内注射の用法用量	5.33mg1筒（溶解液付）		ジェノトロピンTC注用5.3mg	ファイザー	①②
		5mg1筒	後発	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	サンド	—
		12mg1筒（溶解液付）		ジェノトロピンTC注用12mg	ファイザー	①②
		10mg1筒	後発	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	サンド	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	①1型糖尿病 ②慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 ③慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。	5mg1錠		フォシーガ錠5mg	アストラゼネカ	①②③
ダパグリフロジン			後発	ダパグリフロジン錠5mg「TSP」	T'sファーマ＝武田	—
			後発	ダパグリフロジン錠5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ダパグリフロジン錠5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ダパグリフロジン錠5mg「日新」	日新製薬=高田＝ケミファ	—
			後発	ダパグリフロジン錠5mg「EP」	第一三共エスファ	—
			後発	ダパグリフロジン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	—
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物		10mg1錠		フォシーガ錠10mg	アストラゼネカ	①②③
ダパグリフロジン			後発	ダパグリフロジン錠10mg「TSP」	T'sファーマ＝武田	—
			後発	ダパグリフロジン錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ダパグリフロジン錠10mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ダパグリフロジン錠10mg「日新」	日新製薬=高田＝ケミファ	—
			後発	ダパグリフロジン錠10mg「EP」	第一三共エスファ	—
			後発	ダパグリフロジン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—
		5mg1錠(OD)	後発	ダパグリフロジンOD錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
		10mg1錠(OD)	後発	ダパグリフロジンOD錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
デクスメデトミジン塩酸塩	①小児の非挿管での非侵襲的な処置及び検査時の鎮静の効能と用法	200μg2mL1瓶		プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	デクスメデトミジン静注液200μg「サンド」	サンド	—
		200μg50mL1筒		プレセデックス静注液200μg／50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	デクスメデトミジン静注液200μg／50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	—
デノスマブ(遺伝子組換え)	①骨巨細胞腫の効能と用法	130mg26mL1瓶		ランマーク皮下注120mg	第一三共	①
			後発	デノスマブBS皮下注120mgRM「F」	富士製薬	—
トラスツズマブ(遺伝子組換え)	①HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌 ②がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸	60mg1瓶		******ハーセプチン注射用60	中外製薬	①②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	セルトリオン=日本化薬	②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイ	ファイザー	—
		150mg1瓶		ハーセプチン注射用150	中外製薬	①②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	セルトリオン=日本化薬	②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CT」	セルトリオン	②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイ	ファイザー	—
トシリズマブ(遺伝子組換え)	①既存治療で効果不十分な下記疾患 成人発症スチル病の効能と用法	80mg1瓶		アクテムラ点滴静注用80mg	中外	①
			後発	トシリズマブBS点滴静注80mg「MA」	持田＝あゆみ製薬	—
			後発	トシリズマブBS点滴静注80mg「CT」	セルトリオン	—
		200mg1瓶		アクテムラ点滴静注用200mg	中外	①
			後発	トシリズマブBS点滴静注200mg「MA」	持田＝あゆみ製薬	—
			後発	トシリズマブBS点滴静注200mg「CT」	セルトリオン	—
		400mg1瓶		アクテムラ点滴静注用400mg	中外	①
			後発	トシリズマブBS点滴静注400mg「MA」	持田＝あゆみ製薬	—
			後発	トシリズマブBS点滴静注400mg「CT」	セルトリオン	—
トルバプタン	①抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善	1%1g		サムスカ顆粒1%	大塚製薬	①
			後発	トルバプタン顆粒1%「トーワ」	東和薬品	—
			後発	トルバプタン顆粒1%「サワイ」	沢井	—
		3.75mg1錠(OD)	後発	トルバプタンOD錠3.75mg「TE」	トーアエイヨー	—
			後発	トルバプタンOD錠3.75mg「ニプロ」	ニプロ	—
		7.5mg1錠(OD)		サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬	①
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	トーアエイヨー	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	ニプロ＝フェルゼン	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」	東和薬品	—
		15mg1錠(OD)		サムスカOD錠15mg	大塚製薬	①
			後発	トルバプタンOD錠15mg「TE」	トーアエイヨー	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ＝フェルゼン	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「サワイ」	沢井	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ニロチニブ塩酸塩二水和物	①小児の用法用量	150mg1錠		タシグナカプセル150mg	ノバルティスファーマ	①
			後発	ニロチニブカプセル150mg「サワイ」	沢井	—
		200mg1錠		タシグナカプセル200mg	ノバルティスファーマ	①
			後発	ニロチニブカプセル200mg「サワイ」	沢井	—
フィルグラスチム（遺伝子組換え）	①神経芽腫に対するジヌツキシマブ（遺伝子組換え）の抗腫瘍効果の増強の効能と用法	75μg0.3mL1筒		グランシリンジ75	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	富士製薬	
			後発	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	日本化薬	—
		150μg0.6mL1筒		グランシリンジ150	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	富士製薬	—
			後発	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	日本化薬	—
		300μg0.7mL1筒		グランシリンジM300	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	富士製薬	—
			後発	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	日本化薬	—
フェソテロジンフマル酸塩	①神経因性膀胱における排尿管理の効能と用法	4mg1錠		トビエース錠4mg	ファイザー	①
			後発	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg「サワイ」	沢井	—
		8mg1錠		トビエース錠8mg	ファイザー	①
			後発	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠8mg「サワイ」	沢井	—
フェブキソスタット	①痛風、高尿酸血症に対する小児用法	10mg1錠		フェブリク錠10mg	帝人ファーマ	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「日新」	日新製薬	—
		20mg1錠		フェブリク錠20mg	帝人ファーマ	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「日新」	日新製薬	—
		40mg1錠		フェブリク錠40mg	帝人ファーマ	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「日新」	日新製薬	—
フェブキソスタット水和物		10mg1錠	後発	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	東和薬品	—
		20mg1錠	後発	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	東和薬品	—
		40mg1錠	後発	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」	東和薬品	—
フェブキソスタット		10mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」	日本薬工＝フェルゼン	—
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	日新製薬	—
		20mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」	日本薬工＝フェルゼン	—
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—
			後発	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」	日新製薬	—
		40mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」	日本薬工＝フェルゼン	—
			後発	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」	日新製薬	—
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	2.1mg1枚		デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」	祐徳	—
		4.2mg1枚		デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」	祐徳	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」	祐徳	—
		12.6mg1枚		デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」	祐徳	—
		16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」	祐徳	—
		0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」	祐徳	—
		1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」	祐徳	—
		3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」	祐徳	—
		5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」	祐徳	—
		6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」	祐徳	—
フェンタニルクエン酸塩	〔成人〕 ①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法	0.5mg1枚		フェントステープ0.5mg	久光＝協和キリン	①
		1mg1枚		フェントステープ1mg	久光＝協和キリン	①
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		2mg1枚		フェントステープ2mg	久光＝協和キリン	①
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		4mg1枚		フェントステープ4mg	久光＝協和キリン	①
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		6mg1枚		フェントステープ6mg	久光＝協和キリン	①
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		8mg1枚		フェントステープ8mg	久光＝協和キリン	①
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	①造血幹細胞の末梢血中への動員	3.6mg0.36mL1筒		ジーラスタ皮下注3.6mg	協和キリン	①
			後発	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	持田	—
			後発	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	持田製薬販売＝ニプロ	—
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	①早産が予期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制	2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①
			後発	リノロサール注射液2mg(0.4%)	わかもと	—
		4mg1管		リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①
			後発	リノロサール注射液4mg(0.4%)	わかもと	—
ベバシズマブ（遺伝子組換え）	①卵巣癌 ②進行又は再発の子宮頸癌 ③悪性神経膠腫 ④切除不能な肝細胞癌 ⑤神経線維腫症2型	100mg4mL1瓶		アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④⑤
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	日本化薬	①　③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	①　③
			後発	*****ベバシズマブBS点滴静注100mg「アムジェン」	アムジェン	①　③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「日医工」	日医工	—
		400mg16mL1瓶		アバスチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④⑤
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	日本化薬	①　③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	①　③
			後発	*****ベバシズマブBS点滴静注400mg「アムジェン」	アムジェン	①　③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「日医工」	日医工	—
ベンダムスチン塩酸塩水和物	①慢性リンパ性白血病	25mg1mL1瓶	後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「イセイ」	コーアイセイ=高田	—
		100mg4mL1瓶		トレアキシン点滴静注液100mg／4mL	シンバイオ製薬	①
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「イセイ」	コーアイセイ=高田	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ボルテゾミブ	①マントル細胞リンパ腫 ②全身性ALアミロイドーシス	3mg1瓶		ベルケイド注射用3mg	ヤンセン	①②
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	日本化薬	①
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」	高田	①
			後発	*****ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクルト」	高田	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ファイザー」	ファイザー	—
		2mg1瓶	後発	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	東和薬品	①
メトロニダゾール	①酒さ	0.75%1g		ロゼックスゲル0.75%	マルホ	①
			後発	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	丸石製薬	—
ランジオロール塩酸塩	①〈成人〉における以下の効能と用法 生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合： 心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 ②〈成人〉における以下の効能と用法 敗血症に伴う下記の頻脈性不整脈： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 ③〈小児〉における以下の効能と用法 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈： 上室頻拍、心房細動、心房粗動	50mg1瓶		オノアクト点滴静注用50mg	小野	①②③
			後発	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	富士製薬	—
		150mg1瓶		オノアクト点滴静注用150mg	小野	①②③
			後発	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	富士製薬	—
リツキシマブ（遺伝子組換え）	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）の再発予防 ⑤下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植 ⑥下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植 ⑦自己免疫性溶血性貧血 （次頁に続く）	100mg10mL1瓶		リツキサン点滴静注100mg	全薬工業=全薬販売	①②③④⑤⑥⑦⑧
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	⑦
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド＝協和キリン	—
		500mg50mL1瓶		リツキサン点滴静注500mg	全薬工業=全薬販売	①②③④⑤⑥⑦⑧
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	⑦
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド＝協和キリン	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リツキシマブ（遺伝子組換え）（続き）	⑧頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群に対する用法用量の変更 〔変更前は1回量375mg/m2を1週間間隔で2回点滴静注。ただし、1回あたりの最大投与量は500mgまでという用法。 変更後は1回375mg/m2（小児期発症の場合、最大500mg）を1週間間隔で2回点滴静注する。その後、成人期発症の場合は、初回投与から6ヵ月後に375mg/m2を1回点滴静注するという用法〕					
リバーロキサバン	①Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制	10mg1錠		イグザレルト錠10mg	バイエル	①
			後発	リバーロキサバン錠10mg「バイエル」	バイエルLS＝第一三共エスファ	—
			後発	リバーロキサバン錠10mg「サワイ」	沢井	—
		15mg1錠		イグザレルト錠15mg	バイエル	①
			後発	リバーロキサバン錠15mg「バイエル」	バイエルLS＝第一三共エスファ	—
			後発	リバーロキサバン錠15mg「サワイ」	沢井	—
		10mg1錠(OD)		イグザレルトOD錠10mg	バイエル	①
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	バイエルLS＝第一三共エスファ	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」	辰巳=ケミファ＝フェルゼン	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」	日医工	—
		15mg1錠(OD)		イグザレルトOD錠15mg	バイエル	①
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	バイエルLS＝第一三共エスファ	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」	辰巳=ケミファ＝フェルゼン	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」	沢井	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」	日医工	—
リュープロレリン	①球脊髄性筋委縮症の進行抑制	11.25mg1筒		リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田	①
			後発	リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」	あすか製薬＝武田薬品	—
			後発	リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	ニプロ	—
レナリドミド水和物	①再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫 ②再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 ③5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群	2.5mg1カプセル		レブラミドカプセル2.5mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	①②③
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」	ブリストル・マイヤーズスクイブ販売=ブリストル・マイヤーズ スクイブ	②③
レナリドミド			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「F」	富士製薬	②③
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」	沢井	②③
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「トーワ」	東和薬品	②③
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」	藤本製薬＝日本化薬	—
レナリドミド水和物		5mg1カプセル		レブラミドカプセル5mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	①②③
			後発	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	ブリストル・マイヤーズスクイブ販売=ブリストル・マイヤーズ スクイブ	②③
レナリドミド			後発	レナリドミドカプセル5mg「F」	富士製薬	②③
			後発	レナリドミドカプセル5mg「サワイ」	沢井	②③
			後発	レナリドミドカプセル5mg「トーワ」	東和薬品	②③
			後発	レナリドミドカプセル5mg「FNK」	藤本製薬＝日本化薬	③

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
レベチラセタム	①部分発作（二次性全般化発作を含む）に対する生後１ヵ月以上４歳未満の小児てんかん患者の用法用量	500mg1瓶		イーケプラ点滴静注500mg	UCB	①
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	日新製薬	—
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeika	—
レベチラセタム	①部分発作（二次性全般化発作を含む）に対する生後１ヵ月以上４歳未満の小児てんかん患者の用法用量	50%1g		イーケプラドライシロップ50%	UCB	①
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「YD」	陽進堂	—
			後発	レベチラセタムDS50%「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	レベチラセタムDS50%「サワイ」	沢井	—
			後発	レベチラセタムDS50%「タカタ」	高田	—
			後発	レベチラセタムDS50%「トーワ」	東和薬品＝共創未来ファーマ＝三和	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」	日医工	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日新」	日新製薬	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	MeijiSeika	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

Ⅱ．先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アジルサルタン	①6歳以上の小児における用法用量 ②2歳以上6歳未満の小児における用法用量 （②は10mgと20mg製剤のみの用法用量）	10mg1錠		アジルバ錠10mg	武田	①②
			後発	アジルサルタン錠10mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アジルサルタン錠10mg「トーワ」	東和薬品＝三和化学＝共創未来ファーマ	①②
			後発	アジルサルタン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アジルサルタン錠10mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①②
			後発	アジルサルタン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	アジルサルタン錠10mg「サンド」	サンド	—
			後発	アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	T’sファーマ＝武田	—
		20mg1錠		アジルバ錠20mg	武田	①②
			後発	アジルサルタン錠20mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アジルサルタン錠20mg「トーワ」	東和薬品＝三和化学＝共創未来ファーマ	①②
			後発	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アジルサルタン錠20mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①②
			後発	アジルサルタン錠20mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	アジルサルタン錠20mg「サンド」	サンド	—
			後発	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	T’sファーマ＝武田	—
	①6歳以上の小児における用法用量	40mg1錠		アジルバ錠40mg	武田	①
			後発	アジルサルタン錠40mg「サワイ」	沢井	①
			後発	アジルサルタン錠40mg「トーワ」	東和薬品＝三和化学＝共創未来ファーマ	①
			後発	アジルサルタン錠40mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アジルサルタン錠40mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①
			後発	アジルサルタン錠40mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	アジルサルタン錠40mg「サンド」	サンド	—
			後発	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	T’sファーマ＝武田	—
	①6歳以上の小児における用法用量 ②2歳以上6歳未満の小児における用法用量 （②は10mgと20mg製剤のみの用法用量）	10mg1錠(OD)	後発	アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①②
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①②
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「日新」	日新製薬	①②
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」	ダイト＝フェルゼン	①②
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—
		20mg1錠（OD）	後発	アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①②
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①②
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「日新」	日新製薬	①②
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」	ダイト＝フェルゼン	①②
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—
	①6歳以上の小児における用法用量	40mg1錠（OD）	後発	アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」	沢井	①
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「日新」	日新製薬	①
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」	ダイト＝フェルゼン	①
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		エビリファイ散1%	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アリピプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾール細粒1%「タカタ」	高田	—
			後発	*****アリピプラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①
		1mg1錠	後発	アリピプラゾール錠1mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠1mg「トーワ」	東和薬品	①②③
		3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①②
			後発	アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	*****アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	*****アリピプラゾール錠3mg「タカタ」	高田	—
		6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①②
			後発	アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	*****アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	*****アリピプラゾール錠6mg「タカタ」	高田	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①②
			後発	アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①
			後発	*****アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	*****アリピプラゾール錠12mg「タカタ」	高田	—
	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠	後発	アリピプラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①
			後発	アリピプラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリピプラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①
	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	3mg1錠(OD)		エビリファイOD錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	—
			後発	*****アリピプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
		6mg1錠(OD)		エビリファイOD錠6mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	—
			後発	*****アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
		12mg1錠(OD)		エビリファイOD錠12mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①②
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—
			後発	*****アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①
	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠(OD)		エビリファイOD錠24mg	大塚製薬	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原	—
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①
	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包		エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬	①②③
		0.1%1mL1包	後発	アリピプラゾール内用液1mg分包「トーワ」	東和薬品	①②③
		0.1%3mL1包	後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	*****アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	*****アリピプラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	*****アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」	高田	—
		0.1%6mL1包	後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	*****アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	*****アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	*****アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田	—
		0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	*****アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	*****アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	*****アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田	—
インフリキシマブ（遺伝子組換え）	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶		レミケード点滴静注用100	田辺ファーマ	①②
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	セルトリオン＝日本化薬	①②
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CT」	セルトリオン	①②
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	******インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—
			後発	******インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管		ラジカット注30mg	塩野義	①
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	①
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新製薬	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—
		30mg20mL1瓶	後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—
		30mg100mL1キット		ラジカット点滴静注バッグ30mg	塩野義	①
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	①
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—
			後発	*****エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—
カルボプラチン	①子宮体癌の効能と用法 ②乳癌に対する用法用量のうち、「PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌に対するペムブロリズマブ（遺伝子組換え）及びゲムシタビン塩酸塩との併用」の用法 ③乳癌に対する用法用量のうち、「ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌に対する術前薬物療法として、ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）及びパクリタキセルとの併用」の用法	50mg5mL1瓶		パラプラチン注射液50mg	チェプラファーム	①②③
			後発	カルボプラチン注射液50mg「NK」	ヴィアトリスHC＝日本化薬	①②③
			後発	******カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	ヴィアトリスHC＝日本化薬	①②③
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「SW」	沢井	①
			後発	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	日医工	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	サンド	—
		150mg15mL1瓶		パラプラチン注射液150mg	チェプラファーム	①②③
			後発	カルボプラチン注射液150mg「NK」	ヴィアトリスHC＝日本化薬	①②③
			後発	******カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	ヴィアトリスHC＝日本化薬	①②③
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「SW」	沢井	①
			後発	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	日医工	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	サンド	—
		450mg45mL1瓶		パラプラチン注射液450mg	チェプラファーム	①②③
			後発	カルボプラチン注射液450mg「NK」	ヴィアトリスHC＝日本化薬	①②③
			後発	******カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	ヴィアトリスHC＝日本化薬	①②③
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「SW」	沢井	①
			後発	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	日医工	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	サンド	—
タクロリムス水和物	①細胞移植に伴う免疫反応の抑制	0.5mg1カプセル		プログラフカプセル0.5mg	アステラス	①
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	ヴィアトリスHC＝ヴィアトリス	①
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ＝サンド	—
		0.5mg1錠	後発	タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	①
			後発	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	①
		1mg1カプセル		プログラフカプセル1mg	アステラス	①
			後発	タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	ヴィアトリスHC＝ヴィアトリス	①
			後発	タクロリムスカプセル1mg「サンド」	ニプロファーマ＝サンド	—
		1mg1錠	後発	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	①
			後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	①
			後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」	東和薬品	①
		1.5mg1錠	後発	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	①
			後発	タクロリムス錠1.5mg「トーワ」	東和薬品	①
		2mg1錠	後発	タクロリムス錠2mg「あゆみ」	あゆみ製薬	①
			後発	タクロリムス錠2mg「トーワ」	東和薬品	①
		3mg1錠	後発	タクロリムス錠3mg「あゆみ」	あゆみ製薬	①
			後発	タクロリムス錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	①骨髄異形成症候群に伴う貧血 ②ベルズチファン投与に伴う貧血	5μg/シリンジ		ネスプ注射液5μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注5μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注5μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		10μg/シリンジ		ネスプ注射液10μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注10μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注10μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		15μg/シリンジ		ネスプ注射液15μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注15μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注15μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	①骨髄異形成症候群に伴う貧血 ②ベルズチファン投与に伴う貧血	20μg/シリンジ		ネスプ注射液20μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注20μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注20μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		30μg/シリンジ		ネスプ注射液30μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注30μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧBS注30μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	①骨髄異形成症候群に伴う貧血 ②ベルズチファン投与に伴う貧血	40μg/シリンジ		ネスプ注射液40μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン　アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ　ｱﾙﾌｧBS注40μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ　ｱﾙﾌｧBS注40μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		60μg/シリンジ		ネスプ注射液60μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン　アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ　ｱﾙﾌｧBS注60μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ　ｱﾙﾌｧBS注60μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		120μg/シリンジ		ネスプ注射液120μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン　アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ　ｱﾙﾌｧBS注120μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ　ｱﾙﾌｧBS注120μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		180μg/シリンジ		ネスプ注射液180μgプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン　アルファ注180μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①②
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ　ｱﾙﾌｧBS注180μgｼﾘﾝｼﾞ「三和」	三和化学	—
			後発	ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ　ｱﾙﾌｧBS注180μgｼﾘﾝｼﾞ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
ドブタミン塩酸塩	①心エコー図検査における負荷	100mg1管		ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	①
			後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	ヴィアトリスHC＝ヴィアトリス	①
			後発	******ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①
		0.1%200mL1袋		ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①
			後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」	ヴィアトリスHC＝ヴィアトリス	①
		0.3%200mL1袋		ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①
			後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	ヴィアトリスHC＝ヴィアトリス	①
		0.1%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「テルモ」	テルモ	—
			後発	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「KKC」	テルモ＝協和キリン	—
		0.3%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	テルモ	—
			後発	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ＝協和キリン	—
		0.6%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」	テルモ	—
			後発	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」	テルモ＝協和キリン	—
パクリタキセル	①進行又は再発の子宮頸癌に対する用法用量に、「他の抗悪性腫瘍剤との併用でF法」を追加。 （変更前の上記適応に対する用法は「シスプラチンとの併用でD法」のみ。これに上述の用法用量が追加された）	100mg16.7mL1瓶		タキソール注射液100mg	チェプラファーム	①
			後発	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	日本化薬	①
			後発	******パクリタキセル注射液100mg「NP」	ニプロ	—
			後発	*****パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	ファイザー	—
			後発	*****パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	沢井	—
		30mg5mL1瓶		タキソール注射液30mg	チェプラファーム	①
			後発	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	日本化薬	①
			後発	******パクリタキセル注射液30mg「NP」	ニプロ	—
			後発	*****パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	ファイザー	—
			後発	*****パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	沢井	—
パロノセトロン塩酸塩	①18歳以下の用法用量	0.75mg5mL1瓶		アロキシ静注0.75mg	大鵬薬品	①
			後発	パロノセトロン静注0.75mg／5mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	①
		0.75mg2mL1瓶	後発	パロノセトロン静注0.75mg／2mL「日医工」	日医工	①
		0.75mg50mL1袋		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鵬薬品	①
			後発	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	①
		0.75mg2mL1筒	後発	パロノセトロン静注0.75mg／2mLシリンジ「トーワ」	東和薬品	—
			後発	パロノセトロン静注0.75mg／2mLシリンジ「NP」	シオノギファーマ＝ニプロ	—
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠		ファムビル錠250mg	旭化成セラピューティクス＝マルホ	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト＝日本ジェネリック	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーアバイオテックベイ＝陽進堂	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産＝日本臓器	—
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.5mg1錠	後発	リスペリドン錠0.5mg「NP」	ニプロ＝ケミファ	①
			後発	リスペリドン錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	リスペリドン錠0.5mg「クニヒロ」	皇漢堂	—
		1mg1錠		リスパダール錠1mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン錠1mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠1mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドン錠1mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	リスペリドン錠1mg「ニプロ」	全星薬品工業＝ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	—
		2mg1錠		リスパダール錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン錠2mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠2mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドン錠2mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	リスペリドン錠2mg「ニプロ」	全星薬品工業＝ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.5mg1錠(OD)		リスパダールOD錠0.5mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①
		1mg1錠(OD)		リスパダールOD錠1mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品	①
		2mg1錠(OD)		リスパダールOD錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	①
		0.1%1mL、0.1%0.5mL1包、0.1%1mL1包、0.1%2mL1包		リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①
		0.1%1mL	後発	******リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁＝杏林＝キョーリンリメディオ	①
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」	共和薬品	①
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「杏林」	同仁＝杏林＝キョーリンリメディオ	①
		0.1%0.5mL1包	後発	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	①
		0.1%1mL1包	後発	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	①
		0.1%2mL1包	後発	リスペリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	①
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「NIG」	日医工岐阜＝日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	—
		5mg1錠		クレストール錠5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「NIG」	日医工岐阜＝日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	—
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—
		10mg1錠	後発	ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	①
		2.5mg1錠(OD)		*****クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト＝科研	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年11月5日－

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	5mg1錠(OD)		*****クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト＝科研	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①

＜改訂履歴＞

2026年11月5日　アフリベルセプトBS硝子体内注射液40mg／mL「NIT」および同硝子体内注射用キット40mg／mL「NIT」に、糖尿病黄斑浮腫の効能効果が追加されました。これにより、糖尿病黄斑浮腫についてはすべての後発品で先発品と相違がなくなったため、次回更新時に違いのある効能効果等の欄から糖尿病黄斑浮腫を削除します。

2026年10月29日　ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」、ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」に、「①敗血症に対する小児の用法用量」、「②深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染に対する小児の用法用量」が追加されました。これにより後発品は先発品と相違がなくなったため、 次回のリスト更新時に当該成分の欄を削除します。

・トシリズマブBS点滴静注80mg「CT」、同200mg「CT」、同400mg「CT」に、SARS-CoV-2による肺炎（ただし、酸素投与を要する患者に限る）の効能と用法が追加されました。これにより、後発品で相違がある2つの効能等のうち②はすべて後発品は先発品と相違がなくなったため、次回のリスト更新時に②の効能を削除します。

2026年10月19日　リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」の添付文書が削除されたため、リストから削除しました。また、リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」、同2mg「ヨシトミ」の販売元から田辺ファーマが削除されたためリストの「会社名」欄を修正しました。

2026年10月2日　ラジカット注30mgおよびラジカット点滴静注バッグ30mgが田辺ファーマから塩野義製薬に承継されたため、承継前の品目を削除し、承継後の品目をリストに追加しました。

・次の品目が最終出荷製品の使用期限満了により添付文書が削除されたためリストから削除しました。
　アリピプラゾール錠3mg「JG」、同錠6mg「JG」、同錠12mg「JG」、エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」

2026年10月1日　トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CT」の添付文書が公開されたため、当該有効成分の欄に追加しました。

・インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CT」の添付文書が公開されたため、当該有効成分の欄に追加しました。

2026年9月11日　ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」において、本年8月にクローン病の維持療法の効能効果（違いのある効能効果等の①）が追加されていました。

2026年9月7日　ダパグリフロジン錠5mg「ニプロ」、同10mg「ニプロ」が発売され先発品と効能効果等に違いがあるため、ダパグリフロジン錠の欄に追加しました。

2026年9月4日　エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」、エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」に悪性軟部腫瘍の効能効果が追加されました。これにより、すべての後発品は先発品との相違がなくなったため次回更新時にエリブリンメシル酸塩の欄を削除します。

・スニチニブ錠12.5mg「NK」に膵神経内分泌腫瘍の効能効果が追加されました。これにより後発品は先発品との相違がなくなったため次回更新時にスニチニブリンゴ酸塩の欄を削除します。

2026年9月2日　タクロリムスカプセル5mg「サンド」の添付文書が削除されたため、本リストから削除しました。これにより、タクロリムス経口剤の5mg製剤では後発品は先発品との相違がなくなったため次回更新時にタクロリムス経口剤の5mg製剤(5mgカプセル及び5mg錠）の欄を削除します。

2026年8月27日　レナリドミドカプセル2.5mg「トーワ」、同5mg「トーワ」に、再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫の効能効果、用法用量が追加されました。

2026年8月25日　ウステキヌマブの先発品であるステラーラ皮下注45mgシリンジおよびステラーラ点滴静注130mgにおいて、クローン病の維持療法の用法用量に、小児の用法用量が追加されたため、違いのある効能効果等の欄に、45mg製剤には③として、130mg製剤には②として追加しました。

＜医薬品製造販売会社へのお願い＞

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。